

A surveiller de près ...



Le Sporobole engainé

Sporobolus vaginiflorus



© CBNBP-MNHN

- **Origine** : Amérique du Nord
- **Floraison** : août à octobre
- **Mode de dispersion** : par graines
- **Ecologie** : milieux perturbés, bords de route
- **Statut** : **espèce émergente**

Localisation en région Centre-Val de Loire

Depuis 2005, 3 stations sont connues dans le département de l'Indre sur les communes de Migné, Moebecq, Vandoeuvres, au sein du PNR de la Brenne. En 2015, une nouvelle station a été découverte en forêt domaniale de Châteauroux (Le Poinçonnet).



Les 3 critères de reconnaissance



© CBNBP-MNHN

1

Plante d'un vert tendre, **rougissant rapidement** après la floraison, formant des tapis orangés sur les bords de route et milieux perturbés

2

Courte inflorescence **restant longtemps engainée** et tige rougeâtre



© CBNBP-MNHN



blade
© Anna Gardner

3

Ligule et base de la feuille **bordées de longs poils**

Vous pensez avoir déjà remarqué cette plante quelque part ou vous pensez connaître des endroits propices à son installation? Contactez le CBNBP délégation Centre-Val de Loire afin de faire remonter vos observations. N'hésitez pas à joindre des photos et/ou échantillons pour faire valider rapidement vos données ! Merci de votre contribution.

Contacts CBNBP : emilie.vallez@developpement-durable.gouv.fr ou floriant.desmoulin@developpement-durable.gouv.fr

© Noir Papillon

