

Le Castor d'Europe (*Castor fiber*)

Classe : Mammalia - Famille : Castoridae - Genre : Castor



Carte d'identité



Poids : 16 à 28 kg.



Taille : 80 – 100 cm (dont 29 à 31 cm pour la queue).



Alimentation : herbivore (plantes herbacées, écorces, bourgeons...) et jeunes pousses des arbres à bois tendre (peuplier, saule...).



Période de présence : toute l'année.



Milieu : eaux courantes et non stagnantes (rivières, ruisseaux, estuaires, littoral).



Statut : protection nationale, annexes 2 et 4 de la directive européenne Habitats Faune Flore ; vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale des mammifères.

Espèce protégée

Identification

Le Castor est le plus gros rongeur d'Europe. Il est reconnaissable à sa queue écailleuse en forme de palette large et plate d'une trentaine de centimètres. Il est de couleur brun foncé à gris-noir légèrement plus clair au niveau du ventre. La femelle dispose de deux paires de mamelles. Le castor peut être confondu à la nage avec le ragondin. Pourtant, sa nage est très coulée, le corps est presque immergé sauf la nuque et la moitié supérieure de la tête.

Habitat

Animal semi-aquatique, il a besoin d'eau et d'arbres. Le castor peut s'installer aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux. Les plans d'eau peuvent être colonisés lorsqu'ils sont reliés au réseau hydrographique ou bien lorsqu'ils sont très proches de celui-ci. Les conditions nécessaires à son implantation sont la présence permanente de l'eau même quand la profondeur de celle-ci est temporairement faible (au moins 50 à 60 cm).



Placer le badge ici

En Centre-Val de Loire

A la fin du XIX^e siècle, le castor avait disparu des rives de la Loire, une opération de réintroduction dans le Loir-et-Cher de 1974 à 1976 est à l'origine de son retour dans tout le bassin de la Loire.

Son comportement territorial explique, entre autres, pourquoi ses populations croissent lentement. Son installation en Centre-Val de Loire est aujourd'hui importante.

Il a été observé sur 31 sites protégés par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dont de nombreux sites de bords de Loire, comme les Îles de la Gargaude, les Rives de Beaugency, le Val de Montlouis...

Il a également recolonisé de nombreux affluents comme le Cher et a été vu sur l'Île Marie ou encore les Prés de Saint-Loup. Il a même été observé sur des sites Conservatoire du bassin du Loing comme les Prairies humides de l'Ouanne.

En savoir plus/bibliographie :

<https://centrederesources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/des-nouvelles-du-castor-en-region-centre-val-de-loire>

<http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-biodiversite-et-milieus-naturels-a2920.html>

www.cen-centrevaldeloire.org