

Le Courlis cendré (*Numenius arquata*)

Classe : Aves - Famille : Scolopacidae - Genre : Numenius



Carte d'identité



- Poids** : 475 à 1360 g en moyenne.
- Taille** : 50 à 60 cm (envergure 80 à 100 cm).
- Alimentation** : carnivore (insectes, mollusques).
- Période de présence** : février à juillet.
- Milieu** : milieux humides (marais, prairies...).
- Statut** : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) et sur la liste rouge européenne de l'UICN (2015).

Identification

Les courlis ont un long bec incurvé vers le bas. Les parties supérieures sont couvertes de plumes brunes munies, suivant leur emplacement, d'ourlets, barres, indentations ou stries beige-roussâtre. La tête, le cou et la poitrine sont roussâtres, striés de brun. La gorge est blanche. L'œil sombre est cerclé de blanc. Le bec est brun avec la base de la mandibule inférieure rose. Les flancs blancs montrent des dessins bruns en forme d'ancre. Le ventre est blanc.

En Centre-Val de Loire

Avec un peu moins de 150 couples nicheurs dans l'Indre, le Loir-et-Cher, le Cher et l'Indre-et-Loire, le Courlis cendré est en déclin.

Cet oiseau se retrouve sur tout de même 22 sites du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, sur de nombreux sites prairiaux, comme les fameuses Prairies du Fouzon, site inondable de bords du Cher et du Fouzon. Ces espaces ouverts sont pâturés ou fauchés pour nourrir les moutons et les chèvres et constituent un milieu accueillant pour cette espèce.


Partout où les sites hébergent des prairies accueillantes pour le courlis, le Conservatoire maintient, avec les éleveurs et agriculteurs, une activité agricole adaptée et restaure les parcelles envahies par les arbustes et arbres.

En savoir plus/bibliographie :

<https://www.png-courliscendré.fr>

Habitat

Le Courlis cendré est un oiseau des milieux très ouverts et le plus souvent humides. Il se reproduit dans des habitats assez divers qui ont en commun une vue dégagée, un sol meuble et profond et une grande diversité végétale. Ainsi les marais, prairies et landes plus ou moins humides, marais côtiers, etc. peuvent être occupés. Relativement récemment, il s'est adapté aux grandes prairies agricoles. Les courlis ont l'habitude de se rassembler pour la nuit en dortoirs populeux. Ce sont des endroits proches des zones d'alimentation mais hors d'eau, comme par exemple des îlots émergés.



Placer le badge ici

www.cen-centrevaldeloire.org



Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé

Source :

<https://www.oiseaux.net/oiseaux/courlis.cendre.html>