

# Le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)

Classe : Aves - Famille : Meropidae - Genre : Merops



## Carte d'identité



⚠ Espèce protégée

- Poids** : 44 à 78 g en moyenne.
- Taille** : 27 à 30 cm (44 à 49 cm d'envergure).
- Alimentation** : insectivores (guêpes, abeilles).
- Période de présence** : mai à août.
- Milieu** : milieux aquatiques (bords des cours d'eau).
- Statut** : protection nationale ; vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale des oiseaux.

## Identification

Le Guêpier d'Europe a le dos brun-marron à jaune paille, le ventre bleu turquoise, la calotte brune, la gorge jaune, les ailes mêlant brun, bleu vert et bord de fuite noir. La queue est bleue avec une pointe effilée. Le bec assez long et arqué est noir. Un bandeau noir qui entoure un oeil à l'iris rouge lui donne un air canaille et le front blanc complète l'inventaire des couleurs. Souvent en petites bandes, il s'annonce par des cris caractéristiques faits d'une succession de trilles roulés.

## Habitat

Au mois de mai, le Guêpier d'Europe revient de ses quartiers d'hiver en Afrique de l'Ouest et se regroupe en petites colonies de quelques individus ou dizaines d'individus. Ces colonies s'installent dans des zones comprenant des petites falaises de terrain meuble (sableux), où il creuse ses terriers, à proximité d'eau, berges de rivières, falaises, carrières et remblais voire parfois un simple petit talus. Pour le trouver, il faut donc prospecter les sablières et les rives des cours d'eau notamment. Mais attention à ne pas le déranger au risque de mettre en péril la prochaine génération de guêpier...



Placer le badge ici

## En Centre-Val de Loire

Le Guêpier d'Europe est principalement présent dans le sud de la France avec de forts effectifs, mais on peut également l'observer dans de nombreux autres départements plus au nord comme en Centre-Val de Loire, où des observations sont plus rares mais possibles.

**Sur l'ensemble des sites du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, l'espèce a été observée sur treize sites dont plus de la moitié se situent dans le Cher sur les bords de Loire (Val d'Herry, les Iles de la Gargaude, le Bec d'Allier) ou les bords du Cher (le Pont et les Sablons de Corquoy). Le Bois des Roches, dans l'Indre, ou bien encore les Rives de Saint-Firmin, les Plages de Beauget, les Mahyses, les Varinnes et les Îles de Bonny, dans le Loiret, sont également des sites où l'on peut avoir l'occasion d'observer ce bel oiseau.**

Cette espèce est fortement convoitée notamment par les photographes et observateurs divers. Soyez vigilants quant au dérangement que vous pouvez occasionner lors de vos observations. Restez à bonne distance !

### En savoir plus/bibliographie

[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/3582](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582)

Revue Recherches naturalistes n°1 N.S. - juin 2015 - Aperçu du choix des proies et tactique alimentaire chez le Guêpier d'Europe dans le Val de Loire - Jean-David Chapelin-Viscardi *et al.* - p 30-32

[www.cen-centrevalde Loire.org](http://www.cen-centrevalde Loire.org)



Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé