

Le Triton crêté (*Triturus cristatus*)

Classe : Amphibia - Famille : Salamandridae - Sous-famille : Pleurodelinae - Genre : Triturus



Carte d'identité



Poids : 7 à 9 g en moyenne.



Taille : 115 à 160 mm en moyenne.



Alimentation : carnivore (planctons, larves, insectes).



Période de présence : printemps et été.



Milieu : mares en contexte ouvert, étangs ou plans d'eau.



Statut : protection nationale, annexes 2 et 4 de la directive européenne « habitats faune flore » ; quasi menacé (NT) sur la liste rouge régionale des amphibiens.

⚠ Espèce protégée


Identification

Le Triton crêté est le plus grand représentant de la famille des salamandridés. Il a la peau rugueuse et une longue crête lui parcourt le dos et la queue lors de la période de reproduction. Dans la phase terrestre, les crêtes ont tendance à disparaître. La peau des adultes est marron et tachetée de noir. Les femelles arborent fréquemment une ligne dorsale plus claire. La partie abdominale est jaune orangée.

Habitat

Le Triton crêté est fréquent sur les milieux les plus divers liés aux eaux stagnantes, du ruisseau forestier aux mares des zones littorales riches en chlorure jusqu'aux zones acides des tourbières. Il a une attirance toute particulière pour les milieux bocagers, au sein desquels la profusion de mares conditionne, entre autres, sa présence.

Le Triton crêté adulte est aquatique durant plusieurs mois autour de la période de reproduction (février à juillet), mais il est terrestre le reste de l'année.



Placer le badge ici

En Centre-Val de Loire

Cette espèce protégée au niveau national est présente sur l'ensemble de la région et plus précisément dans chaque département.

Au sein du réseau d'espaces préservés par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, une quinzaine de sites accueillent cette espèce :

- quatre dans le Cher : le Val d'Herry, les Prairies de Guzon, la Mare des Bruères, les Vallées ;
- quatre dans l'Indre : la Carrière Chéret, les Communaux, les Brandes de Bellebouche et l'Étang Massé ;
- trois dans le Loiret : la Plaine de Villaine, le Méandre de Guilly et les Varinnes ;
- deux en Eure-et-Loir : l'Étang de la Benette et les Robichonneries ;
- deux en Loir-et-Cher : l'Étang de Beaumont et les Perrières.

En savoir plus/bibliographie :

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139/

www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/

[Fiches_habitats/Triton_crete.pdf](http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Fiches_habitats/Triton_crete.pdf)

<http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/avancement-du-projet-datlas-regional-amphibiens-et-reptiles-en-centre-val-de-loire>

www.cen-centrevalde Loire.org